

**Tabela A. 1.** Amostra composta por 45 indivíduos adultos da necrópole Largo Cândido dos Reis com os respetivos números de enterramentos e contentores.

Nº Ent.	Nº Cont.	Nº Ent.	Nº Cont.	Nº Ent.	Nº Cont.	Nº Ent.	Nº Cont.
135	1077	363	919	185	1118	483	1172
	1090	4		186	1119	484	911
136	1078	368	922	189	1121	507	1188
146	1083	369	923				3
147	1084	370	868	192	1123	520	918
148	1085	372	866				1078
153	1105	387	884	201	1018	521	1185
157	1100	388	886		1		3
158	1101	389	1	203	1019	529	1183
			911				1182
159	1100	390	904		1129		1178
160	1099	395	2	355	917		1179
164	1097	399	900		1103	544	
173	1091	401	909		917		
176	1089	402	906	361	1103		
179	1087	406	910				
			904				
181	1115	407	911				
			912				

Legenda: Nº Ent.= número do enterramento; Nº Cont.= número do contentor.

**Tabela A. 2.** Dados da estatura por cada indivíduo do sexo feminino segundo o método de Mendonça (2000) e o comprimento máximo do esqueleto em campo (Matias, 2007).

Indivíduos Femininos (n=10)	Método de Mendonça (2000)		Comprimento máximo do esqueleto (cm)
	Comprimento fisiológico do fémur (cm)	Comprimento máximo do úmero (cm)	
136			147
158			147
192	154		
368	161	154	155
372	151	152	151
401			152
483			154
484	150		144
520		152	147
529	patologia	patologia	155
Média	154 ± 5,92	152,6 ± 7,70	150

**Tabela A. 3.** Dados da estatura por cada indivíduo do sexo feminino segundo o método de Cordeiro (2009).

<b>Método de Cordeiro (2009)</b>				
Indivíduos Femininos (n=2)	comprimento. fisiológico do 1º metatársico (mm)	comprimento fisiológico do 2º metatársico (mm)	comprimento máximo do 1º metatársico (mm)	comprimento máximo do 2º metatársico (mm)
372	1560			
529	1606	1621	1592	1614
Média	1583 ± 5,31	1621 ± 5,41	1592 ± 5,87	1614 ± 5,65

**Tabela A. 4.** Dados da estatura para cada indivíduo do sexo masculino, segundo o método de Mendonça (2000) e o comprimento máximo do esqueleto em campo (Matias, 2007).

<b>Método de Mendonça (2000)</b>			Comprimento máximo do esqueleto (cm)
Indivíduos Masculinos (n=25)	Comprimento fisiológico do fêmur (cm)	Comprimento máximo do úmero (cm)	
135	168	167	172
147			166
148			
153	166		155
160			169
164	169	173	162
173			166
176	174		
179	170	167	164
181	161,95		155
185		166	169
201	167	168	152
355		172	
363	173	170	162
369	163	158	163
370	162	164	147
387	167	165	163
388	167	164	159
390	165	160	164
395		163	
399	167	162	162
402	178	166	172
407	165	161	156
521	159	159	157
544	166		
Média	167,1 ± 6,90	165 ± 8,44	± 162

**Tabela A. 5.** Dados da estatura por cada indivíduo do sexo masculino segundo o método de Cordeiro (2009).

<b>Cordeiro (2009)</b>				
Indivíduos Masculinos (n=13)	Comprimento fisiológico do 1º metatársico (mm)	Comprimento fisiológico do 2º metatársico (mm)	Comprimento máximo do 1º metatársico (mm)	Comprimento máximo do 2º metatársico (mm)
147	1700		1678	
164	1606	1644	1604	1660
173	1653			
181	1641		1629	
185	1711	1760	1678	
369	1653			
387	1700			
390	1641			
399	1653		1641	
402	1735		1703	
407	1665		1629	
521	1665		1629	
544	1676	1702	1641	
Média	1669 ± 5,31	1702 ± 5,41	1648 ± 5,87	1660 ± 5,65

**Tabela A. 6.** Frequência dos caracteres pós-cranianos pesquisados.

Osso	Caracteres pós-cranianos	n/N		Total	
		D	E	n/N	%
Escápula	Faceta articular acromial	0/17	0/8	0/25	0
	<i>Foramen</i> supraescapular	3/11	3/11	6/22	27
	Sulco circunflexo	0/22	0/18	0/40	0
Clavícula	Perfuração supraclavicular	1/37	3/34	4/71	6
Úmero	Processo supracondilóide	0/42	0/40	0/82	0
	Abertura septal	2/32	2/32	4/64	6,25
Vértebras	Faceta dupla do atlas	3/25	2/24	5/49	10
	Ponte posterior	1/16	1/16	2/32	6,25
	Ponte lateral	1/15	1/16	2/31	6
	<i>Foramen</i> transverso bipartido	1/12	1/13	2/25	8
Coxal	Prega acetabular	3/37	3/30	6/67	9
	Sulco pré-auricular	9/33	9/29	18/62	29
	Facetas acessórias sacrais	4/23	3/21	7/44	16
Fémur	Fossa de <i>Allen</i>	0/26	0/25	0/51	0
	Faceta de <i>Poirier</i>	2/26	1/19	3/45	7
	Placa	2/28	1/25	3/53	6
	Fossa hipotrocanteriana	7/38	7/33	14/71	20
	Exostose na fossa trocanteriana	9/24	8/23	17/47	36
	Terceiro trocânter	4/36	4/32	8/68	12
	Chanfradura <i>vastus</i>	4/12	1/16	5/28	18
Rótula	<i>Vastus</i> fossa	0/12	0/16	0/28	0
	<i>Patella emarginate</i>	0/12	0/15	0/27	0

Legenda: D= direito; E= esquerdo; n/N = presença/total; % = frequência.

**Tabela A. 7.** Continuação da frequência dos caracteres pós-cranianos pesquisados.

Osso	Caracteres pós-cranianos	n/N		Total	
		D	E	n/N	%
Tíbia	Faceta medial de agachamento	2/16	1/16	3/32	9
	Faceta lateral de agachamento	3/17	5/16	8/33	24
	Faceta de agachamento contínua	5/15	6/15	11/30	37
Talus	<i>Os trigonium</i>	1/17	1/20	2/37	5
	Faceta medial	0/23	0/23	0/46	0
	Extensão lateral	0/24	0/24	0/24	0
	Faceta articular inferior dupla	2/21	3/22	5/43	12
	Faceta articular anterior contínua	13/23	14/22	27/45	60
	Faceta articular anterior semi-contínua	8/23	6/22	14/45	31
Calcâneo	Faceta anterior do calcâneo dupla	10/28	10/25	20/53	38
	Faceta anterior do calcâneo ausente	2/25	2/23	4/48	8
	Faceta articular anterior contínua	11/26	10/25	21/51	41
	Faceta articular anterior semi-contínua	2/26	2/26	4/52	8
	Tubérculo peronial	1/8	1/6	2/14	14
	<i>calcaneum secundarium</i>	1/21	2/21	3/42	7

Legenda: D= direito; E= esquerdo; n/N= presença/total; % = frequência.

**Tabela A. 8.** Frequência dos caracteres discretos pesquisados na dentição superior.

Caracteres discretos da dentição superior	dentes	n/N		Total	
		Direito	Esquerdo	n/N	%
tubérculos linguais ou <i>tuberculum dentale</i> (+ = ASU 1-4)	IC	0/15	0/15	0/30	0
	IL	0/17	1/13	1/31	3
	C	0/18	1/16	1/34	3
sulcos corono-radulares ou <i>interruption grooves</i> (+ = ASU +)	IC	0/16	0/15	0/31	0
	IL	4/17	5/15	9/32	28
<i>Shoveling</i> (+ = ASU 2-6; 2-7)	IC	0/21	0/19	0/40	0
	IL	0/24	0/21	0/45	0
crista mesial ou <i>Bushmen</i> (+ = ASU 1-3)	C	6/17	3/12	9/29	31
crista distal acessória (+ = ASU 1-5)	C	1/15	1/11	2/26	8
<i>Odontome</i> (+ = ASU 1)	1°PM	0/24	0/19	0/43	0
	2°PM	0/21	0/21	0/41	0
cúspide 4 ou <i>hypocone</i> (+ = ASU 3-5)	1°M	8/11	10/11	18/22	82
	2°M	8/16	5/12	13/28	46
	3°M	4/14	1/14	5/28	18
cúspide de <i>Carabelli</i> (+ = ASU 2-7)	1°M	0/13	0/14	0/27	0
	2°M	0/18	0/15	0/33	0
	3°M	0/19	0/19	0/38	0

Legenda: IC= incisivo central, IL=incisivo lateral; C=canino; 1°PM= 1° pré-molar; 2°PM= 2° pré-molar; 1°M= 1° molar; 2°M= 2° molar; 3°M= 3° molar; n/N = presença/total; % = frequência.

**Tabela A. 9.** Continuação da frequência dos caracteres discretos pesquisados na dentição superior.

Caracteres discretos da dentição superior	dentes	n/N		Total	
		Direito	Esquerdo	n/N	%
<b>Cúspide 5</b> (+ = ASU 1-5)	1°M	1/11	1/11	2/22	9
	2°M	0/13	0/14	0/27	0
	3°M	0/13	0/16	0/29	0
<b>Tubérculos marginais mesiais acessórios</b> (+ = ASU 1)	1°M	0/11	1/10	1/21	5
	2°M	3/17	1/16	4/33	12
	3°M	1/17	1/18	2/35	6

Legenda: IC= incisivo central, IL=incisivo lateral; C=canino; 1°PM= 1° pré-molar; 2°PM= 2° pré-molar; 1°M= 1° molar; 2°M= 2° molar; 3°M= 3° molar.; n/N = presença/total; %= frequência.

**Tabela A. 10.** Frequência dos caracteres discretos pesquisados na dentição inferior.

Caracteres discretos da dentição inferior	dentes	n/N		Total	
		Direito	Esquerdo	n/N	%
<b>tubérculos linguais</b> (+ = ASU 1-4)	IC	1/1	1/1	2/2	100
<b>winging ou rotação mesiolingualmente</b> (+ = ASU 1)	IC	1/1	1/1	2/2	100
<b>crista mesial ou Bushmen</b> (+ = ASU 1-3)	C	3/21	2/17	5/38	13
<b>crista distal acessória</b> (+ = ASU 1-5)	C	2/19	1/15	3/3	9
<b>raiz bifurcada</b> (+ = ASU 1)	1°PM	1/1	0/1	0/1	100
<b>2 ou mais cúspides linguais</b> (+ = ASU 1)	2°PM	0/23	0/24	0/47	0
<b>5 cúspides</b> (+ = ASU 1-5)		9/9	7/7	16/16	100
<b>padrão Y</b> (+ = ASU 1)		3/4	5/5	8/9	89
<b>padrão X</b> (+ = ASU 1)		1/5	0/5	1/10	10
<b>padrão +</b> (+ = ASU 1)	1°M	0/4	0/5	0/9	0
<b>cúspide 6</b> (+ = ASU 1-5)		1/8	0/7	1/15	7
<b>cúspide 7</b> (+ = ASU 1-5)		0/8	0/6	0/14	0
<b>4 cúspides</b> (+ = ASU 1-5)		14/16	15/18	29/34	85
<b>padrão X</b> (+ = ASU 1)		6/14	8/13	14/27	52
<b>padrão Y</b> (+ = ASU 1)		3/14	2/13	5/27	19
<b>padrão +</b> (+ = ASU 1)	2°M	5/14	3/13	8/27	30
<b>cúspide 6</b> (+ = ASU 1-5)		0/17	0/18	0/35	0
<b>cúspide 7</b> (+ = ASU 1-5)		0/17	0/18	0/35	0
<b>4 cúspides</b> (+ = ASU 1-5)		9/13	12/17	21/30	70
<b>padrão X</b> (+ = ASU 1)		7/12	12/14	19/26	73
<b>padrão Y</b> (+ = ASU 1)		4/12	1/14	5/26	19
<b>padrão +</b> (+ = ASU 1)	3°M	1/12	1/14	2/26	8
<b>cúspide 6</b> (+ = ASU 1-5)		0/12	0/16	0/28	0
<b>cúspide 7</b> (+ = ASU 1-5)		0/12	0/16	0/28	0

Legenda: IC= incisivo central, IL=incisivo lateral; C=canino; 1°PM= 1° pré-molar; 2°PM= 2° pré-molar; 1°M= 1° molar; 2°M= 2° molar; 3°M= 3° molar.; n/N = presença/total; %= frequência.

Figura A. 11. Distribuição das lesões cariogênicas por tipo dentário no maxilar e mandíbula.

Maxilar	Tipo de cárie	grande cárie	cárie oclusal	cárie nos locais pit	cárie na dentina	cárie coroa mesial	cárie da raiz mesial	cárie da coroa distal	cárie da raiz distal	cárie do esmalte bucal	cárie da raiz bucal	cárie do esmalte lingual	cárie da raiz lingual	Total n	Total %
Direito	IC	0	-	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3	2,2
	IL	2	-	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	3
	C	2	-	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	7	5
	1° PM	2	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	9	7
	2° PM	4	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	10	7,4
	1° M	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	6	4,4
	2° M	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	3
	3° M	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	6	4,4
Esquerdo	IC	0	-	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	2,2
	IL	3	-	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	9	7
	C	4	-	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0	10	7,4
	1° PM	3	1	0	1	3	1	3	1	0	0	1	0	14	10,4
	2° PM	3	1	0	0	2	3	2	4	0	0	1	0	16	12
	1° M	2	1	0	0	3	1	0	7	0	0	0	0	14	10
	2° M	0	3	0	1	0	3	1	3	0	1	0	0	12	9
	3° M	1	1	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	7	5
Total	n	28	14	0	3	19	16	22	25	0	4	3	0	134	100
	%	21	10,44		2,23	14,1	12	16	19	0	3	2,23	0	100	-
<b>Mandíbula</b>															
Direito	IC	0	-	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1
	IL	1	-	0	0	1	0	3	1	0	2	0	0	8	6
	C	1	-	0	1	2	1	4	1	0	2	0	0	12	8
	1° PM	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	9	6
	2° PM	2	1	0	0	2	2	5	0	0	0	0	0	12	8
	1° M	3	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	9	6
	2° M	0	0	0	0	3	1	0	2	0	1	0	0	7	5
	3° M	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	1	9	6
Esquerdo	IC	0	-	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	5	3
	IL	2	-	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5	3
	C	2	-	0	0	0	0	2	2	0	3	0	0	9	6
	1° PM	3	1	0	0	3	1	2	4	0	1	0	0	15	10
	2° PM	3	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	11	8
	1° M	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	3
	2° M	4	2	0	1	4	1	0	0	0	1	0	0	13	9
	3° M	2	2	0	1	2	1	1	0	1	4	0	0	14	10
Total	n	29	10	0	3	23	16	23	17	2	20	0	2	145	100
	%	20	7	0	2	16	11	16	12	1	14	0	1	100	-

Legenda: IC= incisivo central, IL=incisivo lateral; C=canino; 1°PM= 1° pré-molar; 2°PM= 2° pré-molar; 1°M= 1° molar; 2°M= 2° molar; 3°M= 3° molar.

**Tabela A. 12.** Distribuição da presença de cáries consoante a localização, sexo e idade dos indivíduos.

Sexo	Grupo etário	Tipo de cárie												Total	
		grande cárie	cárie oclusal	cárie nos locais pit	cárie na dentina	cárie coroa mesial	cárie da raiz mesial	cárie da coroa distal	cárie da raiz distal	cárie do esmalte bucal	cárie da raiz bucal	cárie do esmalte lingual	cárie da raiz lingual	n	%
Masculino	AJ	2	2	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	9	6
	AM	21	8	0	2	20	13	16	18	2	6	2	1	109	73
	AI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
	A	8	1	0	0	2	4	5	6	0	2	0	0	28	18
	<b>SubTotal</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
Feminino	AJ	4	6	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	15	13
	AM	10	3	0	3	7	3	10	5	0	4	1	0	46	38
	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	10	2	0	0	7	11	9	9	0	10	0	1	59	49
	<b>SubTotal</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
Indeterminado	AJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	11
	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	0	0	0	1	2	1	0	3	0	1	0	0	8	89
	<b>SubTotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
Total	<b>n</b>	<b>57</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>279</b>	<b>100</b>
	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>8,6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>11,4</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	

Legenda: AJ=adulto jovem; AM= adulto meia-idade; AI= adulto idoso A= adulto; T= total