

Tabela A. 13. Frequência de osteoartrose na ráquis.

Articulação	Lado	Sem lesão	Com lesão	freq. lesões totais	freq. lesões OA
Vertebras cervicais (corpo)		111/157	labiação (10/157); porosidade (10/157); porosidade e labiação (26/157)	29%	17%
Vertebra cervical (facetatas superiores)	D	112/160	labiação (42/160); porosidade (2/160); porosidade e labiação (4/160)	30%	3%
	E	111/151	labiação (34/151); porosidade (2/151); porosidade e labiação (4/151)	26%	3%
Vertebra cervicais (facetatas inferiores)	D	85/144	labiação (53/144); porosidade (3/144); porosidade e labiação (3/144)	41%	2%
	E	75/132	labiação (52/132); porosidade (2/132); porosidade e labiação (3/132)	43%	2%
Vertebras torácicas (corpo)		119/205	labiação (25/205); porosidade (34/205); porosidade e labiação (27/205)	42%	13%
Vertebras torácicas (facetatas superiores)	D	225/366	labiação (123/366); porosidade (1/366); porosidade e labiação (17/366)	39%	5%
	E	214/317	labiação (90/317); porosidade (2/317); porosidade e labiação (11/317)	32%	3%
Vertebras torácicas (facetatas inferiores)	D	209/381	labiação (144/381); porosidade (6/381); porosidade e labiação (22/381)	45%	6%
	E	208/374	labiação (148/374); porosidade (5/374); porosidade e labiação (13/374)	44%	3%
Vertebras lombares (corpo)		46/77	labiação (9/77); porosidade (10/77); porosidade e labiação (12/77)	40%	16%
Vertebras lombares (facetatas superiores)	D	36/121	labiação (80/121); porosidade e labiação (5/121)	70%	4%
	E	36/116	labiação (74/116); porosidade (2/116); porosidade e labiação (4/116)	69%	6%
Vertebras lombares (facetatas inferiores)	D	39/152	labiação (99/152); porosidade (4/152); porosidade e labiação (10/152)	74%	7%
	E	42/149	labiação (93/149); porosidade e labiação (14/149)	72%	9%

Legenda: D - direito; E - esquerdo; freq. – Frequências.

Tabela A. 14. Frequência de osteoartrose na cintura escapular e na caixa torácica.

Articulação	lado	Sem lesão	Com lesão	freq. lesões totais	freq. lesões O.A.
Clavícula (extremidade esternal)	D	11/16	labiação (2/16); porosidade (2/16); porosidade e labiação (1/16)	31%	6%
	E	6/13	labiação (1/13); porosidade (3/13); porosidade e labiação (3/13)	54%	23%
Clavícula (extremidade acromial)	D	1/4	porosidade (1/4); porosidade e labiação (2/4)	75%	50%
	E	0/2	porosidade (1/2); porosidade e labiação (1/2)	100%	50%
Escápula (faceta articular do acrómio)	D	10/13	porosidade (3/13)	23%	0%
	E	5/6	porosidade (1/6)	17%	0%
Escápula (cavidade glenoide)	D	18/23	labiação (5/23)	22%	0%
	E	13/19	labiação (5/19); porosidade e labiação (1/19)	32%	5%
costelas (superfícies articulares viscerais)	D	36/83	labiação (27/83); porosidade (11/2); porosidade e labiação (9/83)	57%	11%
	E	13/62	labiação (33/62); porosidade (8/62); porosidade e labiação (8/62)	79%	13%
costelas (superfícies articulares esternal)	D	0/8	labiação (1/8); porosidade e labiação (7/8)	100%	88%
	E	0/16	labiação (11/16); porosidade e labiação (5/16)	100%	31%

Legenda: D - direito; E - esquerdo; freq. – Frequências.

Tabela A. 15. Frequência de osteoartrose no esqueleto apendicular superior.

Articulação	lado	Sem lesão	Com lesão	freq. lesões totais	freq. lesões O.A.
Úmero (epífise proximal)	D	9/11	porosidade (2/11)	18%	0%
	E	8/8	-	0%	0%
Úmero (epífise distal)	D	12/14	labiação (1/14); porosidade (1/14)	14%	0%
	E	14/14	-	0%	0%
Rádio (epífise proximal)	D	13/14	labiação (1/14)	7%	0%
	E	15/15	-	0%	0%
Rádio (epífise distal)	D	14/14	-	0%	0%
	E	15/16	labiação (1/16)	6%	0%
Cúbito (epífise proximal)	D	21/25	labiação (3/25); porosidade e labiação (1/25)	16%	4%
	E	20/24	labiação (4/24)	17%	0%
Cúbito (epífise distal)	D	10/11	labiação (1/11)	9%	0%
	E	13/14	labiação (1/14)	7%	0%
Carpós	D	113/116	labiação (2/116); porosidade e labiação (1/116)	3%	1%
	E	103/104	labiação (1/104)	1%	0%
Metacárpós (epífise proximal)	D	50/54	labiação (3/54); porosidade (1/54)	7%	0%
	E	52/60	labiação (5/60); porosidade (3/60)	15%	0%
Metacárpós (epífise distal)	D	55/63	labiação (8/63)	13%	0%
	E	59/62	labiação (3/62)	5%	0%
Falanges das mãos (epífise proximal)	D/E	397/416	labiação (11/416); porosidade (8/416)	5%	0%
Falanges das mãos (epífise distal)	D/E	426/435	labiação (4/426); porosidade (5/426)	2%	0%

Legenda: D - direito; E - esquerdo; freq. – Frequências.

Tabela A. 16. Frequência de osteoartrose na cintura pélvica e esqueleto apendicular inferior.

Articulação	lado	Sem lesão	Com lesão	freq. lesões totais	freq. lesões OA
Coxal (acetábulo)	D	7/32	Labição (1/32), porosidade (21/32); labiação e porosidade (2/32);	78%	6%
	E	4/26	labiação (1/26); porosidade (19/26); labiação e porosidade (2/26)	85%	8%
Sacro (corpo)		10/24	labiação (6/24); porosidade (4/24); porosidade e labiação (4/24)	58%	17%
Fémur (epífise proximal)	D	15/18	labiação (1/18); porosidade (1/18); labiação e porosidade (1/18)	17%	6%
	E	11/13	labiação (2/13)	15%	0%
Fémur (epífise distal)	D	11/14	labiação (3/14)	21%	0%
	E	10/11	labiação (1/11)	9%	0%
Tíbia (epífise proximal)	D	14/17	-	0%	0%
	E	13/14	labiação (1/14)	7%	0%
Tíbia (epífise distal)	D	12/14	labiação (1/14); porosidade (1/14)	14%	0%
	E	13/14	labiação (1/14)	7%	0%
Perónio (epífise distal)	D	5/7	labiação (1/7); porosidade (1/7)	29%	0%
	E	6/7	labiação (1/7)	14%	0%
Astrágalo (faceta articular superior)	D	22/22	-	0%	0%
	E	19/19	-	0%	0%
Tarso (superfícies articulares)	D	69/72	labiação (3/72)	4%	0%
	E	60/60	-	0%	0%
Metatársicos (epífise proximal)	D	19/21	labiação (1/21); porosidade (1/21)	10%	0%
	E	28/32	labiação (3/32); porosidade (1/32)	13%	0%
Metatársicos (epífise distal)	D	11/12	labiação (1/12)	8%	0%
	E	14/15	labiação (1/15)	7%	0%
Falanges dos pés (epífise proximal)	D/E	58/59	labiação (1/59)	2%	0%
Falanges dos pés (epífise distal)	D/E	52/54	labiação (1/54); porosidade (1/54)	4%	0%

Legenda: D - direito; E - esquerdo; freq. – Frequências.